

## **ПАМЯТКА**

### **для населения по профилактике африканской чумы свиней**

Африканская чума свиней – острая вирусная инфекционная болезнь домашних и диких свиней. Человек африканской чумой не болеет.

Возбудитель африканской чумы свиней обладает высокой устойчивостью во внешней среде, долгое время сохраняет активность в условиях холода и высушенном состоянии.

В сырье и продуктах, полученных от больных животных, вирус остается жизнеспособным от нескольких суток до месяца и более.

#### **Характерные признаки болезни у свиней:**

-сверхострое течение: температура до 42°C, сильное угнетение, одышка, полное истощение. Животное больше лежит и гибнет через 24-72 часа;

- острое течение: температура до 40,5-42°C, угнетение, шаткая походка, парез задней части туловища. У больных свиней отмечают признаки поражения органов дыхания, т.е. учащенное прерывистое дыхание, кашель. Иногда гнойно-слизистый конъюнктивит, кровотечение из носа, образование обширных гематом в области паха, лопаток, в результате чего животные плохо передвигаются, больше лежат. Часто наблюдается цианоз (посинение) кожи ушных раковин, конечностей и живота. Супоросные свиноматки abortируют. Гибель животного наступает через 3-5 дней.

Инфекция может распространяться с пищевыми отходами, в которых содержатся необезвреженные продукты убоя, кормами, с транспортными средствами и предметами ухода, загрязненными выделениями больных свиней, с охотничьими трофеями, мясо диких кабанов. Механическим переносчиком могут быть членистоногие (кровососущие насекомые).

#### **Заражение африканской чумой свиней происходит:**

- при контакте с больными домашними и дикими свиньями;
- через инфицированные факторы внешней среды (навоз, вода, подстилка, корма, одежда и обувь обслуживающего персонала, предметы ухода за животными, оборудование, автотранспорт, инфицированные вирусом мелкие частицы кормов, подстилки, почвы могут переноситься ветром на расстояние нескольких километров;
- при переработке инфицированного сырья животного происхождения (мясо, субпродукты, шкуры, щетина, копыта).

#### **Меры профилактики заболевания свиней африканской чумой:**

- соблюдение мер строгой изоляции при содержании животных на фермах, подворьях граждан;
- обеспечить безвыгульное содержание животных, принадлежащих гражданам, исключить контакт с животными других населенных пунктов;
- любое перемещение животных проводить только с согласования с государственной ветеринарной службой района;
- не допускается торговля мясом и мясопродуктами в неустановленных для этой цели местах.

При подозрении на заболевание свиней африканской чумой немедленно сообщить об этом представителю государственной ветеринарной службы. При уходе за животными необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, использовать рабочую спецодежду, спецобувь.